

烟草 *TIR-NBS* 基因家族的生物信息学分析¹

董亚萍¹, 杨仕梅¹, 赵德刚^{1,2}, 宋莉^{1*}

(1. 贵州大学 生命科学院/农业生物工程研究院, 山地植物资源保护与种质创新教育部重点实验室, 贵州省农业生物工程重点实验室, 贵阳 550025; 2. 贵州省农业科学院, 贵阳 550006)

摘要: *TIR-NBS* 基因是一类与植物抗病调节和生长发育密切相关的基因, 其特征解析有助于对植物免疫和发育调节的认识。通过生物信息学分析方法, 从基因鉴定、染色体分布、基因结构、蛋白性质和结构、信号肽、亚细胞定位和顺式作用元件等方面, 对烟草 *TIR-NBS* 基因家族进行鉴定和分子特性分析。研究发现, 烟草 *TIR-NBS* 基因家族含有 30 条成员, 分布在 21 条染色体上, 含有 3~8 个保守基序; 编码蛋白均为不稳定蛋白, 无信号肽, 主要分布于细胞核、细胞质和叶绿体中, 二级结构以 α -螺旋和无规则卷曲为主要构成元件; 进化时主要受纯化选择作用, 与番茄的 *TIR-NBS* 基因亲缘关系最近; 顺式作用元件分析表明其可能受光照、温度以及生长素、茉莉酸甲酯、脱落酸、水杨酸、赤霉素等激素调控。研究结果为进一步探究 *TIR-NBS* 基因的生物学功能及提高植物产量和品质提供了依据。

关键词: 烟草, 抗病调节, 生长发育, 植物免疫, *TIR-NBS* 基因家族, 生物信息学分析

中图分类号: Q943

文献标识码: A

Bioinformatics analysis of tobacco *TIR-NBS* gene family

DONG Yaping¹, YANG Shimei¹, ZHAO Degang^{1,2}, SONG Li^{1*}

(1. College of Life Sciences and Institute of Agro-Bioengineering, Guizhou University/The Key Laboratory of Plant Resources Conservation and Germplasm Innovation in Mountainous Region(Ministry of Education)/Guizhou Key Lab of Agro-Bioengineering, Guiyang 550025, China; 2. Guizhou Academy of Agricultural Sciences, Guiyang 550006, China)

Abstract: The *TIR-NBS* gene is a class of gene closely related to plant disease resistance regulation and growth and development, and its characteristic analysis contributes to the understanding of plant immunity and developmental regulation. Through bioinformatics analysis method, the *TIR-NBS* gene family of tobacco was identified and molecularly analyzed from the

基金项目: 国家转基因生物新品种培育科技重大专项(2016ZX08010003); 贵州省科技计划项目(黔科合基础[2017]1044 号); 贵州省科技计划项目(黔科合平台人才[2017]5788 号) [Supported by The Genetically Modified Organisms Breeding Major Projects of China(2016ZX08010003); Guizhou Province Science and Technology Project([2017]1044); Guizhou Province Science and Technology Project([2017]5788)].

作者简介: 董亚萍 (1993-), 女, 贵州兴仁县人, 研究生, 研究方向为植物发育分子生物学, (E-mail) 1134316710@qq.com.

通信作者: 宋莉, 女, 博士, 教授, 研究方向为植物基因工程研究, (E-mail) lpsssl@126.com.

aspects of gene identification, chromosome distribution, gene structure, protein properties and structure, signal peptide, subcellular localization and cis-acting elements. The study found that the *TIR-NBS* gene family contains 30 members, distributed on 21 chromosomes, containing 3~8 conserved motifs; the encoded proteins are unstable proteins, no signal peptides, mainly distributed in the nucleus, cytoplasm and chloroplast. The secondary structure is characterized by α -helix and random coiling; it is mainly selected by purification in evolution, and has the closest relationship with *TIR-NBS* gene of tomato; Analysis of cis-acting elements showed that it may be regulated by light, temperature, and hormones such as auxin, methyl jasmonate, abscisic acid, salicylic acid, and gibberellin. The results provided a basis for further exploring the biological functions of the *TIR-NBS* gene and improving plant yield and quality.

Key words: *Nicotiana attenuata*, disease resistance regulation, growth and development, plant immunity, *TIR-NBS* gene family, bioinformatics analysis

植物在长期遭受真菌、细菌、病毒等各种病原体侵袭和危害过程中，逐渐形成保护自身的抗病免疫机制，由 R 抗病基因(Resistance gene)介导的免疫反应就是其中一条主要的途径(房卫平，2015；孙岩，2017)。R 基因由白细胞介素-1 受体 (Toll and in-terleukin-1 receptor, TIR) 结构域、功能结构域核苷酸结合位点(Nucleotide binding site, NBS)、富含亮氨酸重复(Leucine rich repeat, LRR)位点等结构组成。其中，TIR 和 NBS 结构与抗病调节相关(Meyers et al., 2002)，TIR-NBS 类抗病基因作为一类重要的植物免疫基因，是 R 基因抗病免疫的重要基础 (Staal et al., 2008；谢冬微，2015)。

TIR、NBS 结构域是抗病基因免疫反应必需的。当拟南芥的抗病基因 RPS4 或 RPP1A 在仅含 TIR 和 NB 结构域的截短蛋白 TIR+ 45 或 TIR+ 80 片段时，即使没有病原菌效应蛋白的诱导也能引起细胞的坏死(Zhang et al., 2004；尹玲等，2018)。烟草抗病毒 N 蛋白的免疫作用与其 TIR 结构域进行信号转导有关(Dinesh-Kumar et al., 2000)。还有研究表明，TIR-NBS 类基因 RLM3 参与了拟南芥广谱抗坏死致病真菌的免疫反应过程 (Staal et al., 2008)。尽管 TIR-NBS 类蛋白在植物抗病过程中扮演着非常重要的角色，但人们对该基因家族及其成员的了解仍极为有限。本研究通过生物信息学分析方法，对烟草 *TIR-NBS* 基因家族的分子特征和功能进行预测分析，为烟草 TIR-NBS 类抗病基因的深入探究提供依据。

1 材料与方 法

1.1 *TIR-NBS* 基因家族鉴定

在 Pfam 中下载 NBS(NB-ARC)(<http://pfam.xfam.org/family/PF00931#tabview=tab6>)和 TIR (<http://pfam.xfam.org/family/PF01582#tabview=tab6>) 隐马尔可夫模型。通过 hmmsearch 程序用下载的 NB-ARC.hmm 和 TIR.hmm 文件对烟草全基因组蛋白数据库中的含 TIR-NBS 结构域的蛋白家族进行预测, 选取的期望值 E 为 1×10^{-20} 。

1.2 染色体定位分析

从 Ensembl 植物全基因组数据库(ftp://ftp.ensemblgenomes.org/pub/plants/release-42/fasta/nicotiana_attenuata)获得 *TIR-NBS* 基因在染色体上的位置信息, 并用在线工具 MG2C(http://mg2c.iask.in/mg2c_v2.0/)制作染色体定位图。

1.3 基因结构与 motif 分析

利用在线工具 GSDS(<http://gsds.cbi.pku.edu.cn/>)对烟草 *TIR-NBS* 基因家族成员进行基因结构分析。通过在线工具 meme(<http://meme-suite.org/tools/meme>)对烟草 TIR-NBS 蛋白 motif 进行预测分析。

1.4 蛋白结构与亚细胞定位分析

利用在线软件 SOPMA (https://npsa-prabi.ibcp.fr/cgi-bin/npsa_automat.pl?page=/NPSA/npsa_sopma.html) 分析 TIR-NBS 蛋白二级结构。利用在线工具 SignalP 4.1 Server (<http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP/>) 对烟草 *TIR-NBS* 基因进行信号肽分析。利用在线工具 DeepLoc (<http://www.cbs.dtu.dk/services/DeepLoc/>) 对烟草 *TIR-NBS* 基因进行亚细胞定位分析。

1.5 *TIR-NBS* 蛋白的理化性质分析

利用 ExPASy 中的 ProtParam (<http://web.expasy.org/protparam/>)软件对烟草 TIR-NBS 蛋白基本特性进行分析, 包括蛋白质大小、相对分子质量、理论等电点、不稳定系数、亲水性指数和脂溶性指数等指标。

1.6 进化选择压力分析

利用 Blast 建库比对和 Calculator 工具(Wang et al., 2010), 对烟草 *TIR-NBS* 基因核苷酸的同义替换率 (Ks) 和非同义替换率 (Ka) 进行计算, 获得基因 Ka/Ks 比率, 进行选择压力分析。

1.7 系统发育分析

将检索得到的烟草 (*Nicotiana attenuata*)、拟南芥 (*Arabidopsis thaliana*)、番茄 (*Solanum*

lycopersicum) 的 TIR-NBS 蛋白的氨基酸序列通过软件 Clustal X 进行 TIR-NBS 蛋白序列比对, 然后利用 MEGA-7.0 (Kumar et al., 2016) 软件构建 *TIR-NBS* 基因家族邻接(NJ, Neighbor-joining)系统发育树, Bootstrap 值设置为 1 000, 其他参数为系统默认值; 使用 FigTree (<http://tree.bio.ed.ac.uk/software/figtree/>) 软件展示系统发育树。

1.8 顺式作用元件分析

利用工具 bedtools (Quinlan, 2014) 获得 *TIR-NBS* 基因上游 2 000 bp 序列, 利用在线网站 PlantCARE(<http://bioinformatics.psb.ugent.be/webtools/plantcare/html/>) 对获得的序列进行预测, 并对主要的顺式作用元件进行探讨。

2 结果与分析

2.1 *TIR-NBS* 基因家族成员

根据 Pfam 数据库中 *TIR-NBS* 基因家族主要含有 NB-ARC、TIR-NB-ARC-LRR、TIR-NB-ARC 功能域的特征, 通过构建隐马尔可夫模型, 设置 E-value 为 1×10^{-20} , 共鉴定到 217 条基因, 去掉不含有 TIR-NB-ARC 结构的基因, 最终获得 30 条烟草 *TIR-NBS* 基因。

2.2 *TIR-NBS* 基因家族的染色体分布

对 *TIR-NBS* 基因染色体定位分析, 结果显示, 30 条 *TIR-NBS* 基因不均匀的分布在 21 条染色体上。其中有 4 条 *TIR-NBS* 基因在 scaffold01866 上, 数量最多且以串联重复形式出现。其次是 1、10、11、scaffold00577、scaffold01435、scaffold02060 号染色体分别有 2 条 *TIR-NBS* 基因。其余染色体仅有 1 条 *TIR-NBS* 基因。




图 1 烟草 *TIR-NBS* 基因在染色体上的位置

Fig. 1 Position of *TIR-NBS* gene on chromosome in *Nicotiana attenuata*

2.3 *TIR-NBS* 基因的结构组成

利用在线网站工具 GSDS 对 30 条烟草 *TIR-NBS* 基因家族成员进行基因结构分析,结果显示(图 2), *TIR-NBS* 基因家族外显子数量主要分布 3~8 之间。利用 meme 对 30 条烟草 *TIR-NBS* 蛋白序列进行分析(图 3), 发现 OIT39360 所含基序最少, 仅 6 个基序, 其余所含基序都较多, 最多为 10 个, 说明该基因家族成员间在功能上可能存在差异。




图 2 烟草 *TIR-NBS* 基因的结构

Fig. 2 Structure of *TIR-NBS* gene in *Nicotiana attenuata*




图 3 烟草 *TIR-NBS* 蛋白保守基序的分布

Fig.3 Distribution of conserved motifs of *TIR-NBS* protein in *Nicotiana attenuata*

2.4 TIR-NBS 蛋白结构特点、细胞位置和信号肽

对 30 条烟草 TIR-NBS 蛋白的二级结构的预测结果表明，TIR-NBS 蛋白由 α -螺旋、延伸链、 β -转角、无规则卷曲组成。其中 TIR-NBS 蛋白的 α -螺旋比例最高，其次是无规则卷曲。根据亚细胞定位分析，结果显示烟草 *TIR-NBS* 基因家族主要定位在细胞核、细胞质、叶绿体。信号肽分析结果表明，*TIR-NBS* 基因家族成员均不含有信号肽。

表 1 烟草 TIR-NBS 蛋白二级结构组成及亚细胞定位

Table 1 Secondary structure and subcellular localizations of TIR-NBS Protein in *Nicotiana attenuata*

蛋白质	α -螺旋	延伸链	β -转角	无规则卷曲	亚细胞定位
Protein	Alpha helix (%)	Extended strand (%)	Beta turn (%)	Random coil (%)	Subcellular localization
OIT40722	45.27	14.43	3.95	36.34	nucl
OIT39360	50.86	13.83	5	29.88	cyto
OIT37819	46.19	14.01	4.06	35.74	nucl
OIT35975	38.97	19.83	9.02	32.18	nucl
OIT35745	48.55	17.34	11.18	22.93	cyto
OIT35602	45.09	15.1	4.24	35.57	chlo
OIT35319	43.92	19.5	9.84	26.75	chlo_mito
OIT35320	46.86	17.44	8.19	27.52	cyto
OIT34932	48.34	14.66	4.64	32.36	nucl
OIT31895	51.45	11.18	3.37	34	nucl
OIT30739	54.24	10.58	3.71	31.46	cyto
OIT30741	53.68	10.81	4.41	31.1	nucl
OIT30588	46.57	13.48	4.6	35.35	nucl
OIT29100	44.89	14.31	4.09	36.71	nucl
OIT29097	45.69	14.39	4.63	35.28	chlo
OIT29099	45.4	15.16	3.83	35.62	mito
OIT29096	49.84	12.91	6.54	30.72	chlo
OIT28454	44.8	14.25	4.1	36.86	nucl
OIT28456	41.91	14.67	4.47	38.95	nucl
OIT27720	50.28	13.08	3.64	32.99	cyto
OIT26264	55.11	13.95	6.22	24.72	cyto
OIT22858	51.81	11.12	4.68	32.39	nucl
OIT08655	51.96	12.66	6.89	28.49	chlo
OIT08444	48.22	13.31	3.87	34.6	nucl
OIT02262	55.39	10.03	3.53	31.05	nucl
OIT00998	52.19	12.14	4.56	31.11	cyto
OIS97981	50.18	12.44	3.22	34.17	nucl
OIS97980	51.82	10.91	3.35	33.93	vacu
OIS97230	50.62	12.35	3.7	33.33	cyto

OIS96639 43.85 14.81 4.53 36.81 chlo

2.5 TIR-NBS 蛋白的理化性质

对烟草 TIR-NBS 家族蛋白的特征进行分析,结果表明烟草 TIR-NBS 蛋白长度范围在 505 ~ 1 508 aa 之间, 相对分子质量大小范围为 46.73~172.53 kDa, 理论等电点范围在 5.78~9.40 之间,编码氨基酸序列最长的是 OIT34932,其相对分子质量也最大,为 172.53 kDa; OIT39360 相对分子质量最小, 为 46.73 kDa。分析表明, TIR-NBS 蛋白为不稳定蛋白, 其中 OIT35745 的不稳定系数最小, 为 33.98。TIR-NBS 蛋白脂溶指数为 90.09~104.23, 总平均亲水性为 -0.445~-0.115, 均为亲水性蛋白。

表 2 烟草 TIR-NBS 蛋白理化性质

Table 2 Protein physical and chemical properties of TIR-NBS in <i>Nicotiana attenuata</i>						
基因 ID	氨基酸数量 Number of amino acids (aa)	分子量 Molecular weight (kDa)	理论等电点 Theoretical isoelectric point (pI)	不稳定指数 Instability index	脂溶指数 Aliphatic index	亲水性的平均值 Grand average of hydropathicity (GRAVY)
OIT40722	1 164	132 616.63	6.30	45.34	98.59	-0.190
OIT39360	405	46 733.23	6.71	40.23	92.17	-0.445
OIT37819	985	111 440.67	8.70	47.15	96.35	-0.205
OIT35975	721	82 972.87	8.53	43.08	95.94	-0.273
OIT35745	519	59 284.23	8.30	33.98	94.61	-0.308
OIT35602	967	110 665.57	6.24	42.22	100.07	-0.191
OIT35319	1 159	130 160.26	8.79	39.02	102.51	-0.124
OIT35320	843	96 202.72	8.84	42.33	100.58	-0.184
OIT34932	1 508	172 528.71	8.53	41.79	97.02	-0.115
OIT30895	1 306	150 144.62	6.04	43.60	99.78	-0.144
OIT30739	1 427	160 867.22	8.29	47.07	104.23	-0.127
OIT30741	1 360	154 530.93	6.70	40.43	101.77	-0.214
OIT30588	1 239	139 896.76	6.59	43.37	95.36	-0.264
OIT29100	1 174	133 684.27	8.12	47.29	94.17	-0.240
OIT29097	1 230	140 457.34	6.02	49.74	95.55	-0.208
OIT29099	1 227	140 396.59	8.47	44.32	99.21	-0.207
OIT29096	612	69 709.89	6.36	40.71	92.04	-0.379
OIT28454	1 172	133 098.54	6.00	43.27	92.73	-0.187
OIT28456	1 186	134 835.18	6.60	50.18	96.88	-0.245
OIT27720	1 070	122 707.11	5.78	45.65	92.73	-0.327
OIT26264	724	82 785.95	5.80	44.29	94.93	-0.245
OIT22858	1 133	129 688	7.64	47.71	97.29	-0.184
OIT08655	537	61 305.41	6.36	50.18	95.40	-0.240
OIT08444	1 292	147 623.45	6.44	47.14	94.29	-0.177
OIT02262	1 446	165 295.46	6.10	43.85	99.02	-0.216

OIT00998	1 096	125 184.82	5.94	44.76	97.33	-0.233
OIS97981	1 399	161 296.18	7.62	47.28	97.09	-0.332
OIS97980	1 403	160 681.97	8.68	46.19	99.12	-0.216
OIS97230	1 053	121 469.36	6.40	46.61	91.92	-0.307
OIS96639	1 236	141 801.16	6.14	47.17	95.64	-0.253

2.6 *TIR-NBS* 基因的进化选择

非同义替换(Ka)和同义替换(Ks)比值 Ka/Ks 可反映生物进化的过程中所受到的选择压力。对来源于 *TIR-NBS* 亚家族间亲缘关系最近的 10 条基因成员进行 Ka/Ks 分析,结果显示该基因对间的 Ka / Ks 比值均小于 1,表明烟草 *TIR-NBS* 基因在进化时主要受纯化选择作用。


表 3 烟草 *TIR-NBS* 基因核苷酸替换率

Table 3 Nucleotide substitution rate of *TIR-NBS* gene in *Nicotiana attenuata*

旁系同源基因位点 Paralogous gene pair locus		非同义替换率 (Ka) Non-synonymous substitution rate	同义替换率 (Ks) Synonymous substitution rate	选择压力比值 (Ka/ Ks) Select pressure ratio
OIS97981	OIS97980	0.169 6	0.303 0	0.559 6
OIT30739	OIT30741	0.451 3	2.193 3	0.205 8
OIT29097	OIS96639	0.228 5	0.912 5	0.250 4
OIT37819	OIT35602	0.213 5	0.346 4	0.616 4
OIT22858	OIT08655	0.241 1	0.609 4	0.395 6

2.7 *TIR-NBS* 基因家族的系统发育树

为了进一步了解烟草 *TIR-NBS* 基因家族进化关系,利用烟草 (30 条)、番茄 (27 条)、拟南芥 (176 条) 共 233 条 *TIR-NBS* 蛋白序列构建 NJ 系统发育树 (图 4),由图可知,30 条 *TIR-NBS* 基因家族成员与番茄的 *TIR-NBS* 基因家族亲缘关系相近。



注：浅蓝色为拟南芥，绿色为番茄，红色字体标记为烟草。

Note: Light blue is *Arabidopsis thaliana*, green is *Solanum lycopersicum*, red is marked as *Nicotiana attenuata*.

图 4 烟草 TIR-NBS 蛋白家族系统进化树

Fig. 4 Distribution of conserved motifs of TIR-NBS protein in *Nicotiana attenuata*

2.8 TIR-NBS 基因家族的顺式作用元件组成

通过对基因上游 2 000 bp 序列进行分析，预测基因的顺式作用元件(图 5)。*TIR-NBS* 基因家族除了存在大量的基本元件 CAAT-box 和 TATA-box 外，还存在参与光响应顺式作用调节元件 ACE、AE-box、AT1-motif、Box 4、CAG-motif、GA-motif、GT1-motif、G-box，胚乳表达所需顺式作用调节元件 GCN4_motif，参与种子特异性调节的顺式作用调节元件 RY-element。此外，*TIR-NBS* 基因家族中还含有与分生组织表达相关的顺式作用调节元件 CAT-box、茉莉酸甲酯反应的顺式作用调节元件 CGTCA-motif、水杨酸反应顺式作用元件 TCA-element、低温响应顺式元件 LTR、防御和应激反应顺式作用元件 TC-rich repeats、昼夜

节律控制顺式作用调节元件 *circadian*，生长素反应顺式作用元件 *AuxRR-core*、*TGA-element* 以及赤霉素反应顺式作用元件 *TATC-box*、*P-box* 等。分析表明，*TIR-NBS* 基因可能受光、温度及生长素、茉莉酸甲酯、脱落酸、水杨酸、赤霉素等激素调控，并可能通过这些顺式作用元件参与了烟草中的防御机制，在植物生长过程中起到防御和保护植物的作用。




图 5 烟草 *TIR-NBS* 基因顺式作用元件位点图
Fig. 5 Site map of *TIR-NBS* gene element in *Nicotiana attenuata*

3 讨论

TIR-NBS 类抗病相关基因是植物抗病免疫系统的一个重要组成部分。它主要的抗病调节结构域包括 *TIR* 和 *NBS* 两部分，其中植物抗病蛋白（*R* 蛋白）中 *TIR* 结构域主要存在于拟南芥和其他双子叶植物中（Meyers et al., 2002），而在单子叶植物中，仅发现了非 *TIR* 序列（Tarr, 2009）。*TIR* 结构域是大约 200 个氨基酸的蛋白质结构域，包括三个高度保守的基序（Slack et al, 2000）。目前，已经在部分生物中鉴定了 *TIR-NBS* 结构域，并证明它与植物致病诱导蛋白和其他植物信号转导蛋白的相互作用（Nandety et al., 2013）。但到目前为止，在烟草基因组水平上，仅有少数 *TIR-NBS* 类基因家族被鉴定，对于大多数该类基因鲜有报道。

对烟草与拟南芥、番茄 *TIR-NBS* 类基因家族进化关系分析表明，烟草和番茄的 *TIR-NBS* 基因同源性较高，因此烟草和番茄的 *TIR-NBS* 基因家族在生物学功能、生长调控机制上可

能存在相似性。当植物受到病原菌侵害时,水杨酸作为发生超敏反应及形成系统获得性抗性所需要的内源信号分子(陈冲等,2018),其通过诱导病原相关蛋白(pathogenesis-related protein, PR 蛋白)等多种抗病蛋白产生 SAR 起作用(汪尚等,2016)。茉莉酸甲酯参与种子萌发、根生长、生育、果实成熟和衰老等多种发育过程的调节(丛汉卿,2015)。此外,茉莉酸甲酯还能激活植物防御机制,对昆虫引起的伤害、各种致病菌和环境胁迫(如干旱、低温和盐度)作出反应(Cheong et al., 2003)。通过对 *TIR-NBS* 基因顺式作用元件分析表明, *TIR-NBS* 基因家族中含有防御和应激反应、低温响应、光响应、脱落酸反应、MeJA 反应、水杨酸响应、赤霉素响应、分生组织表达等顺式作用元件,可知其不但与植物生长发育有关,还参与免疫应激反应调节,这与上述报道是相符的。

在烟草 *TIR-NBS* 类抗病基因家族中,被报道的基因数目很少,大多数基因的功能到目前为止还不清楚。本研究通过生物信息学方法概括了烟草基因组中的 *TIR-NBS* 类抗病基因的鉴定、基因结构、及顺式作用分析等,对于发掘新的与植物抗病性相关的基因,加快烟草中抗病机制的研究具有十分重要的意义,也为烟草的抗病育种研究奠定了基础。

参考文献

- CHEN C, LIU S, WANG DD, et al., 2018. Identification of cucumber PCD induced by salicylic acid and expression analysis of related genes [J]. *Acta Agric Boreal-Sin*, 33(6): 56 -63. [陈冲, 刘双, 王丹丹, 等, 2018. 水杨酸诱导黄瓜 PCD 的鉴定及相关基因的表达分析[J]. *华北农学报*, 33 (6): 56 - 63.]
- CHEONG Jong-Joo, Choi YANG D, 2003. Methyl jasmonate as a vital substance in plants [J]. *Trends Genet*, 19(7).
- CONG HQ, QI YY, ZHANG ZW, et al., 2015. Sequence analysis of cassava EIN3 gene and its induced expression characteristics of ethylene and methyl jasmonate [J]. *Mol Plant Breed*, 13(12): 2705 - 2712. [丛汉卿, 齐尧尧, 张振文, 等, 2015. 木薯 EIN3 基因的序列分析及其乙烯和茉莉酸甲酯诱导表达特性[J]. *分子植物育种*, 13(12): 2705 - 2712.]
- DINESH-KUMAR SP, THAM WH, BAKER BJ, 2000. Structure-function analysis of the tobacco mosaic virus resistance gene N. *Proc Natl Acad Sci USA*, 97: 14789 - 94.
- FANG WP, XIE DY, LI ZF, et al., 2015. NBS-LRR-like disease-resistant protein-mediated molecular mechanisms of plant disease resistance [J]. *Mol Plant Breed*, 13(2): 469 - 474. [房卫平, 谢德意, 李志芳, 等, 2015. NBS-LRR 类抗病蛋白介导的植物抗病应答分子机制[J]. *分子植物育种*, 13(2): 469 - 474.]

- KUMAR S, STECHER G, TAMURA K, 2016. Mega7: molecular evolutionary genetics analysis version 7.0 for bigger datasets[J]. *Mol Biol Evol*, 33(7): 1870 - 1874
- MEYERS BC, MORGANTE M, MICHELMORE RW, 2002. TIR-X and TIR-NBS proteins: two new families related to disease resistance TIR-NBS-LRR proteins encoded in *Arabidopsis* and other plant genomes[J]. *Plant J*, 32(1).
- NANDETY RS, CAPLAN JL, Cavanaugh K, et al., 2013. The role of TIR-NBS and TIR-X proteins in plant basal defense responses[J]. *Plant Physiol*, 162(3), 1459 - 1472.
- QUINLAN AR, 2014. BEDTools: The Swiss-Army tool for genome feature analysis[J]. *Current Protoc Bioinform*, 47(1), 11.12.11 - 11.12.34.
- SLACK JL, SCHOOLEY K, BONNERT TP, et al., 2000. Identification of two major sites in the type I interleukin-1 receptor cytoplasmic region responsible for coupling to pro-inflammatory signaling pathways[J]. *J Biol Chem*, 275: 4670 - 4678.
- STAAL J, KALIFF M, DEWAELE E, et al., 2008. RLM3, a TIR domain encoding gene involved in broad-range immunity of *Arabidopsis* to necrotrophic fungal pathogens[J]. *Plant J*, 55(2): 188 - 200.
- SUN Y, LIU BL, YUAN LX, et al., 2017. Identification and analysis of NBS resistance gene family of flax carp [J]. *Mol Breed*, 15(4): 1417 - 1425. [孙岩, 刘宝玲, 苑丽霞, 等, 2017. 亚麻 NBS 类抗病基因家族的鉴定与分析[J]. *分子植物育种*, 15(4): 1417 - 1425.
- TARR DE, ALEXANDER H, 2009. TIR-NBS-LRR genes are rare in monocots: evidence from diverse monocot orders [J]. *BMC Res Notes*, 2(1).
- WANG DP, ZHANG YB, ZHANG Z, et al., 2010. Ka Ks_Calculator 2.0: a toolkit incorporating gamma-series methods and sliding window strategies[J]. *Genom Proteom Bioinform*, 8(1): 77 - 80.
- WANG S, XU LQ, ZHANG YX, et al., 2016. Research progress of salicylic acid-mediated disease resistance in plants [J]. *Acta Physiol Sin*, 52(5): 581 - 590. [汪尚, 徐鹭芹, 张亚仙, 等, 2016. 水杨酸介导植物抗病的研究进展[J]. *植物生理学报*, 52(5): 581 - 590.
- XIE DW, LU Y, ZHAO DB, et al., 2015. Genome-wide analysis of flax NBS disease resistance gene families[J]. *Plant Fiber Sci Chin*, 37(3): 113 - 119+125. [谢冬微, 路颖, 赵德宝, 等, 2015. 亚麻 NBS 类抗病基因家族全基因组分析[J]. *中国麻业科学*, 37(3): 113 -119+125.]
- YIN L, FANG H, HUANG Y, et al., 2016. Research progress on various domains of plant

TIR-NB-LRR type disease resistance genes [J]. Guihaia, 37(2): 186 - 190. [尹玲, 方辉, 黄羽, 等, 2016. 植物 TIR-NB-LRR 类型抗病基因各结构域的研究进展[J]. 广西植物, 37(2): 186 - 190.]

ZHANG Y, DOREY S, SWIDERSKI M, et al., 2004. Expression of RPS4 in tobacco induces an AvrRps4-independent HR that requires EDS1, SGT1 and HSP90[J]. Plant J, 40(2), 213 - 224.